



ANAFILAXIA: FATORES DE RISCO



São várias as situações cujo risco de anafilaxia é maior. Idade, algumas doenças, uso de alguns medicamentos, bebidas alcoólicas e certo tipos de atividades estão entre elas

FATORES RELACIONADOS COM A IDADE				
				
Crianças Incapazes de descrever os sintomas	Adolescentes e adultos jovens Comportamentos de risco	Gravidez e Parto Alergia a medicamentos Ex: antibiótico p/ prevenir infecção	Idosos Risco de óbito com reações a antibióticos e picada de inseto	
DOENÇAS CONCOMITANTES				
				
Asma Outras doenças respiratórias	Doenças cardíacas	Mastocitose	Dermatite atópica e Rinite alérgica	Doenças psiquiátricas
MEDICAMENTOS, BEBIDAS ALCOÓLICAS E DROGAS (maconha, cocaína, crack, etc.)				
				
Beta bloqueadores Inibidores da ECA	Alcool, sedativos, hipnóticos, antidepressivos e drogas (afeta o reconhecimento dos sintomas e dos agentes desencadeantes)			
FATORES QUE AMPLIFICAM A ANAFILAXIA				
				
Exercício	Infecções	Stress	Sair da rotina (exemplo: viagens)	Estado pré-menstrual
• Idade, doenças concomitantes e medicamentos contribuem para anafilaxia mais grave e até fatal • Alergias são fatores de risco para anafilaxia desencadeada por alimentos, exercícios e látex mas não apresentam risco elevado para anafilaxia por picada de insetos e meios de contraste • ECA = enzima conversora da angiotensina				

