ANAFILAXIA
COMO IDENTIFICAR?

ANAFILAXIA É MUITO
PROVÁVEL QUANDO...

PULMOLAB
CLÍNICA E LABORATÓRIO

ANAFILAXIA É MUITO PROVÁVEL QUANDO É PREENCHIDO 1 DOS 3 CRITÉRIOS A BAIXO

1 Início súbito (minutos até 2 horas) de sintomas na pele como erupção, coceira, vermelhidão, com ou sem inchaço nos lábios e língua. + pelo menos 1 dos 2 sintomas a baixo.



Sintomas respiratórios súbitos: *(falta de ar, chieira, tosse, estridor e cianose)*

Queda súbita na pressão ou outros sintomas como: *(fraqueza, desmaio, urinar e/ouevacuar)*



2 Dois ou mais dos seguintes sintomas após exposição a uma provável alérgeno. Sintomas geralmente ocorrem nas primeira 2 horas após exposição.

Sintomas de pele de início súbito: *(erupção, coceira, vermelhidão e inchaço de lábios e/ou língua)*

Sintomas respiratórios súbitos: *(falta de ar, chieira, tosse, estridor e cianose)*



Queda súbita na pressão ou outros sintomas como: *(fraqueza, desmaio, urinar e/ou evacuar)*

Sintomas intestinais de início súbito: *(cólica ou dor abdominal, náusea e vômito)*

3 Queda na pressão arterial nas primeiras 2 horas após exposição a um alergênio* sabidamente causador de reação.

A definição de pressão baixa em crianças depende da idade ou 30% de queda de uma pressão conhecida**

Em adultos uma pressão sistólica baixa se define menor de 90 mmHg ou uma queda e 30% da pressão basal.

* Após picada de inseto, queda da pressão arterial pode ser a única manifestação de uma anafilaxia do mesmo modo, após aplicação de vacina de alergia, erupção cutânea pode ser a única manifestação inicial de uma reação anafilática.

** Em crianças, uma queda na pressão sistólica é definida quando esta se encontra abaixo de 70 mmHg entre 1 mês e 1 anos de idade; menor que {70mmHg+(2x idade)} entre 1 e 10 anos, menos de 90 mmhg 11 e 17 anos. Frequência cardíaca normal é definida entre 80-140 batimentos/minuto entre 1-2 anos, entre 80-120 batimentos /minuto aos 3 anos; e de 70-115 batimentos/minutos após 3 anos. Em crianças o comprometimento respiratório é mais frequente do que a queda na pressão. Em caso de choque a taquicardia se manifesta primeiro que a queda de pressão.

ENTRE EM CONTATO

(31) 3291-6011

Avenida do Contorno
9681 - Térreo
Belo Horizonte - MG

PULMOLAB
CLÍNICA E LABORATÓRIO