



ANAFILAXIA

TRATAMENTO

TRATAMENTO
PASSO A PASSO



ANAFILAXIA TRATAMENTO

1 - Aprenda a reconhecer os sintomas e tenha um plano de tratamento por escrito, que deve ser treinado regularmente

2 - Se possível renova o agente causal e verifique se é mesmo uma reação anafilática




3 - Como o paciente deitado, avalie a respiração, o pulso, o estado de consciência e a presença de erupção no corpo.



4 - Chame por ajuda: SAMU (192) ou outro serviço de emergência disponível.

os passos 4, 5 e 6 devem ser realizados o mais rápido possível e de forma simultânea




5 - APLIQUE ADRENALINA : intramuscular, no meio da coxa nas doses recomendadas no plano de ação. Repetir a dose a cada 15 a 30 minutos se necessário (máximo 3 doses). A maioria dos pacientes responde a 1 ou 2 doses.




6 - Mantenha o paciente deitado de costas ou em posição confortável, quando houver dificuldade respiratória ou vômitos. **Mantenha as pernas elevadas.** Parada cardíaca pode ocorrer questão de segundos caso o paciente se levante subitamente.


ANAFILAXIA TRATAMENTO




7 - Quando possível ofereça oxigênio suplementar por máscara a 6 a 8 litros p/mintos.



8 - Pode ser necessário pegar uma veia para administração de soro fisiológico. Quando necessário e se for possível, administrar solução salina a 0,9% o rápido possível. (1 a 2 litros nos primeiros 30 minutos)



8 - Qualquer momento pode ser necessário realizar massagem cardíaca.



9 - A cada 15-30 minutos avaliar a pressão arterial, a frequência cardíaca, e a respiração.

SE POSSÍVEL...

ENTRE EM CONTATO

 (31) 3291-6011

 Avenida do Contorno
9681 - Térreo
Belo Horizonte - MG

